

Tabla de dilución de Neocate® Syneo® Infant

Para padres y cuidadores*



(Dilución estándar) 20 kcal/fl oz 0.66 kcal/ml

Basado en un volumen inicial uniforme de agua:

Estas recetas comienzan con volúmenes exactos de agua a los que se agregan cucharas niveladas sin presionar.

Tenga en cuenta que los volúmenes finales son aproximados.

Neocate Syneo Infant está especialmente formulado para el manejo de la dieta de bebés con alergia a la leche de vaca, alergias a múltiples alimentos y afecciones GI y alérgicas relacionadas, incluidas FPIES, EGID y GER relacionado con alergias alimentarias.

Para alimentación oral y por sonda; no se recomienda su uso en bebés con un catéter venoso central o una sonda de alimentación pospilórica, a menos que un profesional médico lo indique o supervise. No apto para uso parenteral.

Neocate® es una familia de alimentos médicos hipoalergénicos basados en aminoácidos. Neocate está diseñado para su uso bajo supervisión médica.

Volumen de agua [†]		Cantidad de polvo Neocate [‡]			Volumen final aproximado [‡]	
fl oz	ml	cucharadas	gramos	kcal	fl oz	ml
1	30	1	4.7	21.9	1.1	35
2	60	2	9.4	43.8	2.2	65
3	90	3	14.1	65.7	3.3	100
4	120	4	18.8	87.6	4.4	135
5	150	5	23.5	110	5.5	165
6	180	6	28.2	131	6.7	200
7	210	7	32.9	153	7.8	235
8	240	8	37.6	175	9.0	270
9	270	9	42.3	197	10.0	300
10	300	10	47.0	219	11.1	335
11	330	11	51.7	241	12.2	365
12	360	12	56.4	263	13.3	400
14	420	14	65.8	307	15.6	465
16	480	16	75.2	350	17.8	535
18	540	18	84.6	394	20.0	600
20	600	20	94.0	438	22.2	665
22	660	22	103	482	24.4	735
24	720	24	113	526	26.7	800
26	780	26	122	569	28.9	865
28	840	28	132	613	31.1	935
30	900	30	141	657	33.3	1000
32	960	32	150	701	35.6	1065
34	1020	34	160	745	37.8	1135
36	1080	36	169	788	40.0	1200
38	1140	38	179	832	42.2	1265
40	1200	40	188	876	44.4	1335
42	1260	42	197	920	46.7	1400
46	1380	46	216	1007	51.1	1535
50	1500	50	235	1095	55.6	1665
60	1800	60	282	1314	66.7	2000
70	2100	70	329	1533	77.8	2335
85	2550	LATA LLENA	400	1864	95.0	2850

Cómo prepararlo

Consulte la etiqueta de la lata para ver las instrucciones de preparación completas.

1. Lávese bien las manos y limpie el área de preparación. Vierta agua fría y hervida (por debajo de 104 °F/40 °C) en un biberón o recipiente esterilizado.



2. Agregue la cantidad requerida de polvo Neocate Syneo Infant.



3. Tape el biberón o recipiente y agite bien hasta que el polvo se disuelva.



Nutricia recomienda usar agua hervida fría para la preparación y biberones esterilizados. Pregunte a su equipo de cuidado del bebé si necesita usar agua hervida fría para mezclar y si necesita hervir (esterilizar) los biberones, las tetinas y los anillos antes de usarlos.

Información importante sobre la preparación

- UTILIZAR ÚNICAMENTE BAJO SUPERVISIÓN MÉDICA.
- Para obtener más información acerca del uso del producto, visite Neocate.com.
- Alimento inmediatamente O refrigere inmediatamente entre 35 y 40 °F (2-4 °C) y utilice en un plazo de 24 horas.
- Deseche la fórmula que quede en el biberón 1 hora después del inicio de la alimentación.

- Mezclar con agua a más de 104 °F (40 °C) o calentar la fórmula por encima de los 104 °F (40 °C) puede disminuir los beneficios de los cultivos probióticos.
- No hierva la fórmula ni use un microondas para preparar o calentar la fórmula; pueden producirse quemaduras graves.

Almacenamiento

- Almacene la lata en un lugar fresco y seco (no en el refrigerador). No almacene a temperaturas extremas.
- Una vez abierta, vuelva a tapar la lata y úsela en el plazo de 2 semanas.

Última actualización: 8 de julio de 2024

Nutricia North America recomienda utilizar una balanza para lograr una mayor precisión. Las cucharas que proporciona Nutricia están validadas para su uso con fórmulas Nutricia, por lo que son preferibles a las medidas caseras.

* Para la seguridad del paciente, Nutricia les indica a los cuidadores que solicitan instrucciones de mezcla usando diluciones no estándar, o recetas que utilizan medidas caseras en lugar de una balanza o las cucharas proporcionadas, que consulten con su equipo médico para obtener orientación.

† Esta tabla supone que 1 fl oz = 30 ml. Los volúmenes de agua son exactos, pero es posible que el volumen final de la fórmula preparada varíe ligeramente.

‡ Las diluciones son más precisas cuando se pesa el polvo en lugar de medirlo con cucharadas. Las cucharadas deben estar niveladas sin presionar. Una (1) cucharada nivelada sin presionar son 4.7 gramos de polvo y aporta 21.9 kcal. Un (1) gramo aporta 4.66 kcal y sustituye ~0.71 ml de agua.

Si tiene preguntas, comuníquese con:
NutritionServices@Nutricia.com
(800) 365-7354

neocate.com/shop/hypoallergenic-formula-and-products/syneo-infant



© 2024 Nutricia North America. Todos los derechos reservados.